

Tratamiento contra la *Procesionaria*



		EN	FE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOV	DIC
COLLAR TRAMPA	En el anillo árbol		1 collar por árbol										
MASSOCIDE + PROMAX	Piretroide Adherente- Mojante		150 ml x 15 L 300 ml x 15 L										
TRAMPA FEROMONA	Colgada en el árbol							6 trampas / Ha					
KITUR + PROMAX	Bacillus Thuring Adherente- Mojante								50 ml x 15 L 150 ml x 15 L				

Nota: las fechas son orientativas. En las zonas más templadas el ciclo de la procesionaria se alarga mientras en zonas más frías su ciclo es más corto. Por ejemplo, en zonas de costa las orugas de procesionaria pueden bajar a principios de febrero, en cambio en el pirineo pueden hacerlo un mes más tarde.

COLLAR TRAMPA: para colocar alrededor del tronco a una altura de 1,5 m del suelo unas semanas antes de el descenso de orugas.

MASSOCIDE: en el momento que bajan las orugas y las vamos mojando. **Dosis: 150 ml** en mezcla con **PROMAX** como potenciador a **300 ml** por 15 L.

PROMAX: en mezcla con **MASSOCIDE** a **300 ml** por 15 L. / En mezcla con **KITUR** a **150 ml** por 15 L.

TRAMPA FEROMONA: para colgarla en el pino a media altura a partir de finales de junio, 6 trampas por hectárea.

KITUR: para aplicar a finales de verano en el momento de la formación del bolsón. **Dosis: 50 ml** en combinación con **PROMAX** a **150 ml** para 15 litros de agua