

Plan de fertilización para vid en ecológico sin gotero

Este plan de fertilización lo haremos con pulverizador de 15 L



		PARADA INVERNAL	PRIMERAS BROTAIONES PRE - FLORACION	FLORACION CUAJADO	CRECIMIENTO UVA	ENVERO - ENGORDE	RECOLECCION
ACTION PLUS	Orgánico 6-7-7	1 - 2 Kg	1 - 2 kg		1 - 2 Kg		
MICOS	Micorrizas y rizobacterias		100 ml via radicular (3 veces)				
GREETNAL	Fitohormonas naturales		75 ml mochila cada 7-10 dias via foliar				
AMINOLAC BET	Potasio - GlicinaBetaina				100 ml x 15 L Foliar cada 10 dias		
NATURMIX	Fe, Mg, Mn, Zn, Mo, B, Cu				30 ml (cada 10 dias)		
PROMAX	Adherente - potenciador		50 ml foliar 15 L				

NOTA: para mejorar la efectividad de la aplicación, cuando pulvericemos, a parte de mojar bien las hojas de la planta, aplicar **un chorro generoso en la base de la planta**, así el árbol se nutre por la hojas y también por la raíz.

ORGÁNICO ACTION PLUS: **Dosis:** de **1-2 kg** dependiendo si la viña es joven o adulta. Haremos 3 pases: parada invernal (sobre febrero), en floración y 2 meses antes de la recolección. **Forma de aplicación:** aplicaremos **Action Plus** alrededor de la base del tronco: si es joven a un palmo, y si es adulto de 30-40 cm de la base. Si podemos enterrarlo mejor, así haremos que el abono se disuelva antes y actúe más rápido. Después un riego.

MICOS: **Dosis para 10 cepas:** **100 ml** de **Micos** junto a **100 ml** de Ecoactiv para una regadora de 10 litros, que repartiremos 1 litro en la base de la cepa. Haremos 3 pases: antes de la floración, en plena floración y cuando tenga tamaño como un guisante.

GREETNAL: **Dosis:** por via foliar a razón de **75 ml** por pulverizador de 15 litros o regadora de 10 litros. La primera aplicación será 10 dias antes que empiece la floración. Repetir cada 10 dias hasta que el fruto tenga un tamaño medio.

AMINOLAC BET: aportamos Potasio para el engorde y Glicina-Betaina para la llegada de Calcio a los frutos. **Dosis:** **100 ml** por 15 litros cada 10 dias.

NATURMIX: **Dosis:** **30 ml** aplicado al suelo como foliar. Desde el estadio de plántula hasta **Recolección**. Repetir cada 10 dias.

PROMAX: **Dosis:** como humectante-adherente a **50 ml** por cada 15 litros de agua mediante pulverización.